

TAVOLA SINOTTICA ANALGESICI

| | FARMACO | PREPARAZIONE | EFFICACIA EQUIANALGESICA | METABOLISMO | ELIMINAZIONE | BOLO | MANTENIMENTO | INSUFFICIENZA RENALE | INSUFFICIENZA EPATICA | ANZIANO |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---------|
| ENDOVENA | MORFINA | 10 mg | 1 | Epatico | Renale, Fecale | 0.05 mg/kg in 5-15 min | 100 - età/die | X | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | FENTANYL (Fentanest®) | 100 γ | 1 | Epatico | Renale | 1-2 γ/kg | Max 2 γ/kg x h | ↓ dosi | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | REMIFENTANIL (Ultiva®) | 1 mg | 100 | Esterasi plasmatiche e tissutali | Indipendente da metabolismo epatico e renale | Non raccomandato | 0.006-0.7 γ/kg x min | √ | √ | √ |
| | SUFENTANIL (Sufentanil®) | 50 γ | 1 | Epatico | Renale | 0,5-2 γ/kg | 0,15 – 0,7 γ/kg x h | √ | √ | √ |
| | TRAMADOLO (Contramal®) | 100 mg | 1 | Epatico | Renale | Max 100 mg | Max 600 mg/die | ↓ dosi | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | BUPRENORFINA (Temgesic®) | 0.3 mg | 1 | Epatico | Fecale | Max 0.6 mg | Max 2,4 mg/die | √ | ↓ dosi | √ |
| | KETOPROFENE (Artrosilene®) | 100 mg | 0,35 | Epatico | Renale | Max 100 mg | Max 300 mg/die | X | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | PARACETAMOLO (Perfalgan®) | 1000 mg | 0,26 | Epatico | Renale | Max 1000 mg | Max 4000 mg/die | ↓ dosi | X | √ |
| ENTERALE | PARACETAMOLO CODEINA (Tachidol®) | 500 mg + 30 mg | 0,25 | Epatico | Renale | Max 500 + 30 mg | Max 3000 + 180 mg/die | ↓ dosi | X | ↓ dosi |
| | MORFINA (Oramorph®) | 10 mg | 0,33 | Epatico | Renale, Fecale | 10 mg | (100 – età) x 3/die | X | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | PARACETAMOLO OSSICODONE (Depalgos®) | 325 mg+ 5 mg | 0,25 | Epatico | Renale | 325 mg + 5 mg | Max 3900 mg + 60 mg | √ | √ | √ |
| | IDROMORFONE (Jurnista®) | 4 mg | 2 | Epatico | Renale | 8 mg/die | Da titolare con aumenti di 4-8 mg/die | ↓ dosi | X | ↓ dosi |
| TD | FENTANYL (Durogesic®) | 4,2 mg pari a 25 γ/h | 2,67 | Epatico | Renale, Fecale | 25 γ/h | Max 300 γ/h | √ | √ | √ |

TAVOLA SINOTTICA SEDATIVI

| | FARMACO | METABOLISMO | ELIMINAZIONE | BOLO | MANTENIMENTO | INSUFFICIENZA RENALE | INSUFFICIENZA EPATICA | ANZIANO |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| ENDOVENA | PROPOFOL (Diprivan®) | Epatico | Renale | 0,5 mg/kg | 4-6 mg/kg x h | √ | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | MIDAZOLAM (Ipnovel®) | Epatico | Epatica, Renale | 0,03 - 0,3 mg/kg | 0,03-0,2 mg/kg x h | √ | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | KETAMINA (Ketanest®) | Epatico | Renale, Fecale | Max 4,5 mg/kg | 0,3-0,15 γ/kg x min | X | X | ↓ dosi |
| ENTERALE | IDROSSIZINA (Atarax®) | Epatico | Renale | 50-100 mg | Max 600 mg/die | ↓ dosi | ↓ dosi | ↓ dosi |
| | LORAZEPAM (Tavor®) | Epatico | Renale | 1-4 mg | Max 16 mg/die | ↓ dosi | X | ↓ dosi |
| | MELATONINA (Tranquillus®) | Epatico | Renale | 3 mg x 2 | Max 20 mg/die | √ | √ | √ |

TAVOLA SINOTTICA ANTIPSICOTICI

| | FARMACO | METABOLISMO | ELIMINAZIONE | BOLO | MANTENIMENTO | INSUFFICIENZA RENALE | INSUFFICIENZA EPATICA | ANZIANO |
|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------|
| ENTERALE | OLANZAPINA (Zyprexa®) | Epatico | Renale | 10 mg/die | 10-15 mg/die | √ | √ | √ |
| | ALOPERIDOLO (Haldol®) | Epatico | Fecale, Renale | 0,5 - 5 mg | Max 20 mg/die | √ | √ | ↓ dosi |
| | QUIETAPINA (Seroquel®) | Epatico | Renale, Fecale | 50 mg 1°g, 2 volte/die | 100 mg 2°g 200 mg 3°g 300 mg 4°g | √ | √ | √ |
| | RISPERIDONE (Risperdal®) | Epatico | Renale, Fecale | 1 mg x2/die | Max 6 mg/die dal 2° giorno | √ | √ | √ |
| | CLOTIAPINA (Entumin®) | Epatico | Renale, Fecale | 100 mg | Max 900 mg/die | X | √ | √ |