


Valutazione dello stato di coscienza e monitoraggio del delirium

Fase 1 – Livello di Coscienza: RASS

Punteggio	Definizione	Descrizione	
+4	COMBATTIVO	Chiaramente combattivo, violento, imminente pericolo per sé o per lo staff	OSSERVAZIONE
+3	MOLTO AGITATO	Aggressivo, rischio evidente di rimozione invasività	
+2	AGITATO	Frequenti movimenti a finalistici, disadattamento alla ventilazione meccanica	
+1	IRREQUIETO	Ansioso ma senza movimenti aggressivi o vigorosi	
0	SVEGLIO E TRANQUILLO	Comprende i periodi di sonno fisiologico	STIMOLO VERBALE
-1	SOPOROSO	Non completamente sveglio, apre gli occhi allo stimolo verbale, mantiene il contatto visivo > 10 secondi	
-2	LIEVEMENTE SEDATO	Brevi risvegli allo stimolo verbale, contatto visivo < 10 secondi	
-3	MODERATAMENTE SEDATO	Movimenti o apertura degli occhi allo stimolo verbale (ma senza contatto visivo)	
<p>Se RASS ≥ -3 → somministra CAM-ICU (il paziente ha delirium oppure no?)</p>			
-4	SEDAZIONE PROFONDA	Nessuna risposta allo stimolo verbale, movimenti o apertura occhi alla stimolazione fisica	STIMOLO TATTILE
-5	NON RISVEGLIABILE	Nessuna risposta alla stimolazione tattile o dolorosa	
<p>Se RASS ≤ -4 → RIVALUTA più tardi (paziente attualmente incosciente)</p>			

Sessler, et al. AJRCCM 2002; 166:1338-1344.²
 Ely, et al. JAMA 2003; 289:2983-2991.³

Fase 2 – Funzionamento cognitivo: CAM-ICU



Inouye, et al. Ann Intern Med 1990; 113:941-948.¹
 Ely, et al. CCM 2001; 29:1370-1379.⁴
 Ely, et al. JAMA 2001; 286:2703-2710.⁵